



ワクチン		種類	乳児期										幼児期					学童期／思春期													
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上							
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②					③			(注1)																	
	母子感染予防		①	②					③																						
ロタウイルス	1価	生			①	②	(注2)																								
	5価				①	②	③	(注3)																							
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化			①	②	③					④						(注4)													
5種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化			①	②	③					④			7.5歳まで				15歳未満まで使用可能												
3種混合（DPT）		不活化															① (注5)						② 11-12歳 (注6)								
2種混合（DT）		不活化																							①11歳	12歳					
ポリオ（IPV）		不活化																			① (注7)										
インフルエンザ菌b型（ヒブ） ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化			①	②	③					④							(注8)												
4種混合（DPT-IPV） ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化			①	②	③					④			7.5歳まで				15歳未満まで使用可能												
BCG		生									①																				
麻疹・風疹混合（MR）		生											① (注10)							② (注9, 10)											
水痘		生											①			②		(注11)													
おたふくかぜ		生											①									② (注12)									
日本脳炎		不活化						生後6か月から接種可能									① ②	③	7.5歳まで						④ 9-12歳						
不活化インフルエンザ		不活化						生後6か月から接種可能					毎年（10、11月などに）① ②										13歳以上①								
経鼻弱毒生インフルエンザ		生															2歳以上～19歳未満に				毎年（10月、11月などに）① 点鼻										
新型コロナ		mRNA											製剤により使用できる年齢が異なる																		
		不活化																													
ヒトパピローマウイルス（HPV）	9価	不活化																				(注13)	小6	中1① ② (注14)		中2～高1相当		(注15)			
	2価・4価	不活化																				(注13)	小6	中1 ① ② ③ (注14)		中2～高1相当		(注15)			
ワクチン		種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上							

定期接種の
推奨期間定期接種の
接種可能な期間任意接種の
推奨期間任意接種の
接種可能な期間添付文書には記載されていないが
小児科学会として推奨する期間健康保険での
接種時期